

**«БІ. Алтынсарин шағын жинақты жалпы орта мектебінің Комирнати(Пфайзер) вакцинасы
туралы жүргізілген жұмыс**

Хаттамасы

Өткізілген күні: 13.03.2022

Қатысқандар:

1. Дәрігер :Ибрагимов А
2. Мектеп тәрбие ісінің меңгерушісі: Абуов Р
3. Мектеп медбикесі: Юсупова Ж

Күн тәртібінде:

- Құжатпен Қазақстан Республикасында халықты коронавирустық инфекцияға қарсы вакцинациялауды "Комирнати" (Пфайзер, АҚШ) мРНҚ-вакцинасымен жүргізу" туралы әдістемелік ұсынымдар бекітілді.
- "Комирнати" - SARS-CoV-2 тудыратын коронавирустық инфекцияның профилактикасына арналған мРНҚ (нуклеозидтермен модификацияланған) негізіндегі КВИ-ге қарсы вакцина.
- «Комирнати» Пфайзер вакцинасының бала денсаулығына маңызды екендігін ескерту.

13.03.2022 күні акт задында 6-11 сынып ата -аналары қатысуымен Комирнати Пфайзер вакцинасының тиімділігі мен бала денсаулығына маңызды екендігі айтылып өтті.Дәрігер Досанова Ирода - ата-аналарға,Комирнати Пфайзер вакцинасы жайында 12-17жас аралығындағы жасөспірім балаларға салынатындығын ,мектеп егу пунктінде немесе ата-ана калаған жағдайда жершілікті поликлиникасында вакцинация жүргізуге болатындығын,мынандай қарсы көрсетілімдерін :12жасқа дейін :анамнезінде полиэтиленгликольге немесе туыстас молекулаларға ауыр аллергиялық реакциясы бар адамдарға,себебі вакцина құрамында полиэтиленгликоль бар.Сонымен қатпр вакцинация аш қарынға жүргізілмейтіндігін, ата-анасының қатысуымен болатынын айтты.Ал,вакцинаның мынадай асқынуы болуы мүмкіндігін ескертті:Кейбір егілушілерде «Комирнати» вакцинасы келесі күтілген реакцияларды тудыруы мүмкін:

- Өте жиі (10-нан 1-ден көп адамда пайда болуы мүмкін): инъекция орнындағы ауырсыну ,ісіну,шаршағылтық,ба с ауыру ,бұлшық ет ауыру ,буынның ауыру ,қалтырау,диарея,қысба;аталған реакциялардың кейбіреулері 12-15 жас аралығындағы жасөспірімдерде ересектерге қарағанда біршама жиі кездеседі;
- Жиі(10-нан 1-ден көп емес адамда пайда болуы мүмкін):инъекция орнында қызару ,жүрек айну ,жүсу;
- Жиі емес (100-нан 1-ден көп емес адамда пайда болуы мүмкін):үлкейген лимфа түйіндері,әлсіздік, қолдың ауыруы, ұйқысыздық,инъекция орнындағы қышу,бөртпе немесе қышу сияқты аллергиялық реакциялар;
- Сирек (1000-нан 1-ден көп емес адамда пайда болуы мүмкін):бет нервінің уақытша біржақты сал ауыру,есекжем немесе бет ісінуі сияқты аллергиялық реакциялар;

«Ы. Алтынсарин шағын жинақты жалпы орта мектебінің Комирнати(Пфайзер) вакцинасы туралы 2021-2022 жылдары жүргізілген жұмыс

Хаттамасы

Өткізілген күні: 20.02.2022

Қатысқандар:

1. Дәрігер :Ибрагимов А
2. Аға медбике:Жүзенова А
3. Мектеп тәрбие ісінің меңгерушісі:Абуов Р
4. Мектеп психологы: Есдаулет Г
5. Мектеп медбикесі:Юсупова. Ж
6. Ата-аналар мен мұғалімдер
7. Сынып жетекшілер

Күн тәртібінде:

- Құжатпен Қазақстан Республикасында халықты коронавирустық инфекцияға қарсы вакцинациялауды "Комирнати" (Пфайзер, АҚШ) мРНҚ-вакцинасымен жүргізу" туралы әдістемелік ұсынымдар бекітілді.
- "Комирнати" - SARS-CoV-2 тудыратын коронавирустық инфекцияның профилактикасына арналған мРНҚ (нуклеозидтермен модификацияланған) негізіндегі КВИ-ге қарсы вакцина.
- «Комирнати» Пфайзер вакцинасының бала денсаулығына маңызды екендігін ескерту .

20.02.2022 күні спорт задында жоғарғы сынып ата -аналары қатысуымен Комирнати Пфайзер вакцинасының тиімділігі мен бала денсаулығына маңызды екендігі айтылып өтті.Дәрігер Досанова Ирода- ата-аналарға,Комирнати Пфайзер вакцинасы жайында 12-17жас аралығындағы жасөспірім балаларға салынатындығын ,мектеп егу пунктінде немесе ата-ана калаған жағдайда жершілікті поликлиникасында вакцинация жүргізуге болатындығын,мынандай қарсы көрсетілімдерін :12жасқа дейін :анамнезінде полиэтиленгликолге немесе туыстас молекулаларға ауыр аллергиялық реакциясы бар адамдарға,себебі вакцина құрамында полиэтиленгликоль бар.Сонымен қатпр вакцинация аш қарынға жүргізілмейтіндігін, ата-анасының қатысуымен болатынын айтты.Ал,вакцинаның мынадай асқынуы болуы мүмкіндігін ескертті:Кейбір егілушілерде «Комирнати» вакцинасы келесі күтілген реакцияларды тудыруы мүмкін:

- Өте жиі (10-нан 1-ден көп адамда пайда болуы мүмкін): инъекция орнындағы ауырсыну ,ісіну,шаршағылтық,ба с ауыру ,бұлшық ет ауруы ,буынның ауруы ,қалтырау,диарея,қызба;аталған реакциялардың кейбіреулері 12-15 жас аралығындағы жасөспірімдерде ересектерге карағанда біршама жиі кездеседі;
- Жиі(10-нан 1-ден көп емес адамда пайда болуы мүмкін):инъекция орнында қызару,жүрек айну ,құсу;
- Жиі емес (100-нан 1-ден көп емес адамда пайда болуы мүмкін):үлкейген лимфа түйіндері,әлсіздік, қолдың ауруы, ұйқысыздық,инъекция орнындағы қышу,бөртпе немесе қышу сияқты аллергиялық реакциялар;

«Ы. Алтынсарин шағын жинақты жалпы орта мектебінің Комирнати(Пфайзер) вакцинасы туралы 2021-2022 жылдары жүргізілген жұмыс

Хаттамасы

Өткізілген күні: 20.04.2021

Қатысқандар:

8. Дәрігер :Ибрагимов А
9. Аға медбике:Накипова Н
10. Мектеп тәрбие ісінің меңгерушісі:Абуов Р
11. Мектеп психологы:Есдаулет Г
12. Мектеп медбикесі:Рсбекова К
13. Ата-аналар мен мұғалімдер
14. Сынып жетекшілер

Күн тәртібінде:

- Құжатпен Қазақстан Республикасында халықты коронавирустық инфекцияға карсы вакцинациялауды "Комирнати" (Пфайзер, АҚШ) мРНҚ-вакцинасымен жүргізу" туралы әдістемелік ұсынымдар бекітілді.
- "Комирнати" - SARS-CoV-2 тудыратын коронавирустық инфекцияның профилактикасына арналған мРНҚ (нуклеозидтермен модификацияланған) негізіндегі КВИ-ге карсы вакцина.
- «Комирнати» Пфайзер вакцинасының бала денсаулығына маңызды екендігін ескерту .

20.11.2021 -күні спорт задында жоғарғы сынып ата -аналары қатысуымен Комирнати Пфайзер вакцинасының тиімділігі мен бала денсаулығына маңызды екендігі айтылып өтті.Дәрігер Досанова Ирода - ата-аналарға,Комирнати Пфайзер вакцинасы жайында 12-17жас аралығындағы жасөспірім балаларға салынатындығын ,мектеп егу пунктінде немесе ата-ана қалаған жағдайда жершілікті поликлиникасында вакцинация жүргізуге болатындығын,мынандай қарсы көрсетілімдерін :12жасқа дейін :анамнезінде полиэтиленгликольге немесе туыстас молекулаларға ауыр аллергиялық реакциясы бар адамдарға,себебі вакцина құрамында полиэтиленгликоль бар.Сонымен қатпр вакцинация аш карынға жүргізілмейтіндігін, ата-анасының қатысуымен болатынын айтты.Ал,вакцинаның мынадай асқынуы болуы мүмкіндігін ескертті:Кейбір егілушілерде «Комирнати» вакцинасы келесі күтілген реакцияларды тудыруы мүмкін:

- Өте жиі (10-нан 1-ден көп адамда пайда болуы мүмкін): инъекция орнындағы ауырсыну ,ісіну,шаршағылтық,ба с ауыру ,бұлшық ет ауруы ,буынның ауруы ,қалтырау,диарея,қызба;аталған реакциялардың кейбіреулері 12-15 жас аралығындағы жасөспірімдерде ересектерге қарағанда біршама жиі кездеседі;
- Жиі(10-нан 1-ден көп емес адамда пайда болуы мүмкін):инъекция орнында қызару,жүрек айну ,қусу;

2021-2022 жылдар аралығында «COVID-19» вакцинациясы және Корновирустық инфекциясы жайлы мектеп мұғалімдері мен персоналдарға түсіндірме жұмысының

Хаттамасы

«Қос-қорған» жалпы орта мектебінде 28.02.2022жылы -педагогтар мен персоналдар арасында «COVID-19» вакцинациясы және Корновирустық инфекция жайлы түсіндірме жұмысы жүргізілді.

Қатысқаны: Мектеп педагогтары мен персоналдары, мектеп медбикесі.

Күн тәртібінде: мектеп педагогтар мен персоналдар арасында «COVID-19» вакцинациясы және Корновирустық инфекция жайлы түсіндірме жұмысы жүргізу.

Тыңдалды :Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша мектеп медбикесі Г.Абдулхамидова мектеп педагогтары мен персоналдары 28.02.2022ж күні «COVID-19» вакцинациясы және Корновирустық инфекция жайлы түсіндірме жұмысы жүргізу туралы айтып өтті. Ол өз сөзінде корновирустар -құрамында РНҚ бар вирустар тобы, оның ішінде 43 түр 2020 жылдың мамыр айындағы жағдай бойынша екі субфамилияға біріктірілгенін, сүтқоректілерге (соның ішінде адамдарға), құстар мен қосмекенділерге әсер ететінін. Бұл атау вирустық өкпелілігімен байланыстылығын, оның тікенектері күн тәжіне ұқсайтынын, ал адамдардың жұқтыратын 7 белгілі корновирус бар екенін атап өтті:

- HCoV-229E-бұл альфа;
- Корновирус алғаш рет 1960 жылдардың ортасында анықталған;
- HCoV-NL63-альфа-коронавирус, қоздырғыш Нидерлендыда 2004 жылы анықталған;
- HCoV-OC43-бета-коронавирус А, қоздырғыш 1967 жылы анықталған;
- HCoV-NKU1-бета -коронавирус А, қоздырғыш Гонконгта 2005 жылы табылғанын;
- SARS-CoV-бета- коронавирус В, ауыр респираторлық синдромының қоздырғыш, оның бірінші жағдайы 2002жылы тіркелінгенін;
- MERS-CoV-BetacoronavirusC, Таяу Шығыс респираторлық синдромының қоздырғышы, оның өршуі 2015 жылы болғанын ;
- SARS-CoV-2-2019 жылдың екінші жартысында анықталған, COVID-19 пневмониясының жаңа түрінің пандемиясын тудырған және 2020 жылдың көктемінде қарай әлемдік проблемаға айналғанын бета-коронавирус В шекаралар жабылуының және төтенше қауіпсіздік шарпалары енгізілгенін (карантин, қатаң оқшаулау, бетперде кию және т.б) Сонымен қатар, аурудың мынадай симптомдары мен клиникалық көрінісін айтты:

Корновирустық инфекция COVID-19 әр түрлі дәрежеде әсер ететінін, жиі байқалатын белгілері

- Дене температурасының жоғарылауы;
- Құрғақ жөтел;
- Шаршау

Кейбір жұқтырған адамдарда мыналар болуы мүмкіндігін:

- Әр түрлі ауыр сезім;
- Тамақ ауыруы;
- Диарея;
- Конъюнктивит;
- Бас ауруы;
- Иіс пен дәмнің жоғалуы
- Терідегі бөртпе немесе қолдар мен аяқтардағы тырнақтардың депигментациясы.

Арудың ауыр түрінің белгілері:

- Тыныс алудың қиындауы немесе еңтігу;
- Кеудедегі қысылу немесе ауырсыну сезімі .

COVID-19 коронавирусы 2019 жылдың желтоқсан айында Қытай Ухань қаласында пневмониясы бар пациенттер тобында өкпеден алынған сұйықтық үлгілерінен табылған SARS-CoV-2 бетакоронавирусымен қоздырылады.. SARS-CoV-2(бетакоронавирус) Sarbecovirus тұқымына жатады және адам жұқтыруға қабілетті жетінші коронавирус. SARS-CoV - 2 зооантропонозды РНК-құрамында қабығы бар вирус болып табылады. Толық геномның филогенетикалық анализіне сәйкес, алғашында вирус тек жарқанаттардың арасында болды, бірақ адамға әлі белгісіз жануардан берілген.

SARS-CoV-2 вирусына қатысты иммунитет ұзақтығы мен қауырттылығы туралы деректер қазіргі уақытта жоқ, ұзақтығын анықтау үшін сауыққан адамдардың иммунитетіне ұзақ мерзімді Серологиялық зерттеулер талап етіледі[36]. SARS-CoV-2-ден өзгеше коронавирустарға қарсы гуморальді иммунитет қалыптасады, алайда инфекцияның қайта пайда болу жағдайлары (реинфекция) туралы жиі хабарланады. АҚШ-тың Ауруларды бақылау және алдын алу орталықтарының мәліметтері бойынша, COVID-19 жағдайында реинфекция мүмкіндігінің расталуы жоқ болғанша, басқа деректер бойынша мұндай жағдайлар пайда болады және иммуносупрессия тәсілдерін қоса алғанда, түрлі факторлармен байланысты болуы мүмкін. Вирустың РНК бөлінуі сауыққаннан кейін төмендейді және біраз уақыт — күннен аптаға дейін созылуы мүмкін, бірақ бұл өміршең вирустың болуын білдірмейді. Клиникалық сауыққанда IgM - және IgG-антиденелердің пайда болуы байқалады, бұл инфекцияға қарсы иммунитеттің дамуын білдіреді.

азіргі уақытта инфекцияны жұқтыру жағдайында алдын алуға қабілетті ұсынылған құралдар жоқ. SARS-CoV-2 вирусына қарсы вакцина жоқ, бірақ бұл бағытта әзірленімдер жүргізілуде. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДСҰ) SARS-CoV-2 жұқтыру қаупін төмендету бойынша жалпы ұсыныстар берді:

- қолды сабынмен немесе құрамында спирт бар заттармен жуу;
- жөтел немесе түшкіргенде мұрын мен ауызды иілген шынтакпен немесе бір рет қолданылатын майлықпен жауып, кейіннен міндетті түрде қолды жуу керек;
- жөтел немесе дене қызуы жоғары адамдардан алшақ болу (1 метрден кем емес);
- мүмкіндігінше мұрын, ауыз және көзді қолмен ұстамаңыз;
- өкпенің жіті респираторлық ауруының белгілері болған жағдайда үйде қалу;

• безгек, жөтел және тыныс алу қиын болған жағдайда, медициналық мекемеге жүгінуге болады;

• тірі жануарлар, ет немесе құс сатылатын азық-түлік базарларына барған кезде гигиена ережелерін сақтау;

• шікі немесе нашар термиялық өңделген жануарлардан алынатын өнімдерді тұтынудан аулақ болу.

Коронавирустық инфекцияға қатысты түсіндірме жұмыстарына қатысқан педагогтар мен персоналдар:

Қ/с	Аты-жөні
1	Абуов Рысғали
2	Досыбаева Қаламқас
3	Жүсіпбекова Айнұр
4	Жүсіпбекова Клара
	Сопбеков Болат
	Сопбеков Сакен
	Есдаулет Гулнара
	Молдабек Айгүл
	Сұлтан Балжан
	Исабекова П
	Іңкәрбекова Үрзия
	Жарылқасынова Ғалия
	Момбекова Гүлзипа
	Сейтова Оңласын
	Елғонова Гүлзира
	Бұхарбаев Сейілбек
	Балсариєв Еркебұлан
	Садуов Өркен